



Diagnóstico Positivo de PEDV en Granjas de Cerdos de Iniciación, Finalización o Destete a Engorde: ¿Y Ahora Qué?

Positive Diagnosis of PEDV in Nursery, Finisher or Wean-to-Finish Sites: What Next?

La infección con el virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDV por sus siglas en inglés) puede provocar enormes pérdidas económicas para el productor. El virus PEDV se transmite a través de las heces y sobrevive en el estiércol por períodos de tiempo prolongados. Cualquier objeto contaminado con estiércol de cerdo puede ser fuente de infección para los animales. **Existen una serie de medidas importantes a tomar una vez que se confirma el diagnóstico de PEDV en la granja.**

Política del Buen Vecino, COMUNICAR

Sistema de producción

- Si está en un sistema de producción notifique a la oficina central para que se ajusten los protocolos de bioseguridad
- Asegúrese de que todos los supervisores sean notificados de forma inmediata.

Vecinos

- Póngase en contacto con los vecinos que tenga cerdos en su área y adviértales que ha obtenido un diagnóstico positivo y que está trabajando para controlar la infección en su granja.
 - Como regla general notifique a las granjas ubicadas dentro de 1-2 millas.

Fábricas de alimento

- Póngase en contacto con la fábrica si compra alimento.

- Hágalos saber que su rebaño está infectado para que ajusten el cronograma de entrega y los camiones para su granja.
- Continúe la comunicación con ellos sobre el progreso de la infección.

Transportistas

- La comunicación es importante. Es especialmente importante si al momento del diagnóstico se están comercializando los cerdos o se recibieron cerdos de destete o engorde recientemente.
 - También les permite asegurarse de que su equipo esté correctamente limpio y de ajustar la orden de transporte para el resto de sus cerdos.

Recolección de la mortalidad

- Si se utiliza un recolector de mortalidad comercial, hágale saber sobre el estado de PEDV en su granja. Los camiones de entrega pueden hacer ajustes en las rutas.

Trabajadores a medio tiempo, contratistas, electricistas, personal de mantenimiento

- Informe a todo aquel que haya estado en la granja o que haya ayudado en la descarga, con las tareas o reparaciones para que tomen precauciones y medidas para evitar el contagio a sus cerdos o a los de alguien más

Contenga al virus en la granja y evite su propagación

- ❑ Establezca y respete la Línea de Separación que marca el límite entre el exterior y las instalaciones de la granja con su gente y sus animales.
- ❑ Instale un sistema entrada de “bench-entry” (utilización de un banco como línea de separación) o establezca una Línea de Separación clara para evitar trasladar material fuera del corral.
 - Establezca un cruce claro a través de la Línea de Separación (banco o a la entrada) al utilizar overoles y botas en el sitio. Cúbrase con guantes y asegúrese de desecharlos o limpie sus manos cuando deje las instalaciones.
 - Deje todos los materiales en la granja con excepción de la ropa para lavandería, en caso de utilizar ese servicio.
- ❑ Asegúrese de no compartir ningún equipo con otros sitios.
- ❑ Asegúrese de cambiarse de ropa y zapatos y de ducharse antes de dejar una instalación de producción infectada. Un cruce claro previene la propagación de la enfermedad.

Estabilización del Sitio

- ❑ La infección tiende a moverse rápidamente a través del grupo y la granja. Cuanto antes la infección pase por el grupo, más pronto los cerdos alcanzarán el punto en que la presencia de virus sea limitada y haya una exposición uniforme al rebaño. En esta instancia los síntomas clínicos deben disminuir. Consulte a su veterinario.

Limpieza

- ❑ Una vez que ya no haya más síntomas clínicos, lave y desinfecte pasillos, áreas de carga, etc., para ayudar a reducir la carga viral en el ambiente.
- ❑ Lave a presión y desinfecte hasta que el sitio se pueda vaciar

Mortalidad

- ❑ Asegúrese de desechar la mortalidad en forma rápida y apropiada.
- ❑ Una vez que los síntomas clínicos hayan mermado limpie el área en donde se remueven los cerdos muertos, si es posible.
- ❑ Si la grava y el clima lo permiten, utilice una rastra alrededor del perímetro de las instalaciones para asegurarse de que todo el material emerja hacia la superficie y quede expuesto a la luz del sol.

Siga las pautas de bioseguridad publicadas en www.porkboard.org/PEDV