



Eliminación del PEDV de una Granja de Cerdos de Iniciación, Finalización o de Destete a Mercado

Elimination of PEDV from a Nursery, Finish or Wean-to-Finish Site

La infección con el virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDV por sus siglas en inglés) puede provocar enormes pérdidas económicas para el productor. El virus PEDV se transmite a través de las heces y sobrevive en el estiércol por períodos de tiempo prolongados. Cualquier objeto contaminado con estiércol de cerdo puede ser fuente de infección para los animales. **Existen una serie de medidas importantes a tomar una vez que se confirma el diagnóstico de PEDV en la granja.**

Vacíe la granja, mueva a todos los cerdos al sitio de finalización o envíe a los animales a mercado:

- Asegúrese de remover a todos los animales y el alimento del sitio.
 - Incluya la mortalidad.
- Limpie todo el estiércol, derrames de alimento y virutas alrededor del edificio.
- Utilice una rastra alrededor del perímetro de grava de las instalaciones para exponer el material al sol y a los rayos ultravioletas.

Líneas de agua y control de roedores:

- Drene las líneas de agua y límpielas con cloro para asegurarse de que están limpias.
- Renueve los cebos para el control de roedores

Comience una limpieza detallada:

- Realice una limpieza completa del sitio para remover la mayor cantidad de materia orgánica posible.
- Utilice jabón/detergente para ayudar en la eliminación de materia orgánica.
 - No trate de hacerlo todo en un solo lavado, trate de limpiar lo que se pueda en el primer lavado, luego repita según sea necesario.

- Limpie, desinfecte y remueva cualquier material o equipo innecesario de la granja.
- Cualquier equipo que permanezca en la granja debe ser cuidadosamente lavado, desinfectado y secado.
- Asegúrese de incluir la oficina, el área de carga y cualquier depósito al momento de limpiar y desinfectar.
- No se olvide del equipo que esté en el galpón.
 - Deseche todos los paneles de plástico, tablas de clasificación o remos con rajaduras que no puedan limpiarse adecuadamente.
- Inspeccione la granja luego de la limpieza:
 - Redacte una lista de verificación y realice una inspección metódica para no omitir nada. Cualquier resto de alimento, pelo o estiércol que se encuentre indica que se debe limpiar el galpón nuevamente.
 - Asegúrese de que el galpón esté seco antes de la inspección; es muy difícil realizar un buen trabajo de inspección si se encuentra mojado.
 - Utilice una linterna y un destornillador para verificar rajaduras y cerciorarse de que todo esté limpio.
 - Utilice una tiza para marcar las áreas que

necesitan volver a lavarse. Estos procedimientos facilitan que nada se pierda de vista en la limpieza final.

- ❑ Repita la inspección final antes de proceder a desinfectar para confirmar que las instalaciones están completamente limpias.

Desinfección:

- ❑ Una vez que todo esté seco y se haya aprobado la inspección de limpieza, desinfecte las instalaciones de acuerdo con las indicaciones del fabricante del desinfectante.
 - Utilice desinfectantes adecuados para PEDV. Se puede encontrar información de referencia en *aasv.org*.
 - Permita que las instalaciones se sequen completamente antes de aplicar el desinfectante.

Período de inactividad:

- ❑ Mantenga el período de inactividad tanto como sea admisible. La granja debe estar completamente seca entre inspecciones y luego de la desinfección.

Rampas, área de carga y frente del área de ingreso:

- ❑ Se deben limpiar e inspeccionar las rampas y las áreas de carga del mismo modo que el galpón.
- ❑ Una buena manera de asegurarse de que la madera está limpia es volver a pintar o revestir la rampa.
- ❑ Coloque grava nueva delante del área de carga e ingreso para asegurar una superficie limpia.

Siga las pautas de bioseguridad publicadas en www.porkboard.org/PED